


# Determinant

- je číslo jistým způsobem charakterizující čtvercovou matici
- $\det \mathbf{A} = 0$  pro singulární matici,  $\det \mathbf{A} \neq 0$  pro regulární matici
- používá se při řešení lineárních soustav
- ... a v mnoha dalších aplikacích

a) determinant, 9, b) P. Olsák, FEL ČVUT, c) P. Olsák 2010, d) BI-LIN, e) L, f) 2009/2010, g)  Viz p. d. 4/2010

## Definice determinantu

**Definice:** Nechť  $\mathbf{A} = (a_{i,j}) \in \mathbf{R}^{n,n}$  je čtvercová matice. Číslo

$$\sum_{\text{permutace } \pi=(i_1,i_2,\dots,i_n)} \text{sgn } \pi \cdot a_{1,i_1} a_{2,i_2} \cdots a_{n,i_n}$$

nazýváme *determinantem matice*  $\mathbf{A}$  a značíme je  $\det \mathbf{A}$ .

**Poznámka:** Abychom tomu vzorci porozumněli a dokázali z něj odvodit základní vlastnosti determinantů, potřebujeme si připomenout vlastnosti permutací...

## Permutace

Permutace  $n$  prvků je uspořádaná  $n$ -tice čísel z množiny  $\{1, 2, \dots, n\}$ , přitom každé číslo je v  $n$ -tici zastoupeno právě jednou.

Příklad:  $(3, 1, 2, 5, 4)$  je permutace pěti prvků.

$(i_1, i_2, \dots, i_n)$  je permutace z  $n$  prvků, pokud  $i_j \in \{1, 2, \dots, n\}$  a  $i_j \neq i_k$  pro  $j \neq k$ .

**Jiný pohled:** Permutace je bijektivní zobrazení na  $\{1, 2, \dots, n\}$ .

Vztah mezi těmito pohledy: Je-li dána  $n$ -tice  $(i_1, i_2, \dots, i_n)$ , pak je dáno zobrazení  $z : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$  předpisem  $z(j) = i_j$ . Je-li dáno zobrazení  $z$ , pak lze sestavit  $n$ -tici  $(z(1), z(2), \dots, z(n))$ .

BI-LIN, determinant, 9, P. Olsák [3]

## Permutace, vlastnosti

- Skládáním permutací (jako zobrazení) dostáváme permutaci.
- Generická (jednotková) permutace je  $(1, 2, \dots, n)$ .
- Každá permutace má svou inverzní permutaci.
- Počet permutací  $n$  prvků je  $n!$ .

BI-LIN, determinant, 9, P. Olsák [4]

## Znaménko permutace

inverze v permutaci  $(i_1, i_2, \dots, i_n)$  je výskyt jevu:

$$i_j > i_k \text{ a současně } j < k.$$

Příklad: inverze permutace  $(3, 1, 2, 5, 4)$  jsem vyznačil pomocí obloučků:

$$\overbrace{(3, 1, 2, 5, 4)}$$

Tato permutace má tři inverze.

**Definice:** Má-li permutace  $\pi$  sudý počet inverzí, je  $\text{sgn } \pi = +1$ , má-li  $\pi$  lichý počet inverzí, je  $\text{sgn } \pi = -1$ .

Číslo  $\text{sgn } \pi$  říkáme *znaménko permutace*.

Příklad:  $\text{sgn}(3, 1, 2, 5, 4) = -1$ .

Znaménko generické permutace je  $+1$ .

Cvičení: jaké znaménko má permutace  $(n, n-1, \dots, 3, 2, 1)$ ?

## Přechod sudá – lichá

Prohození dvou prvků v permutaci změni znaménko permutace.

Důkaz: V následující permutaci prohodím prvky  $x$  a  $y$ :

(... prvky vlevo ...,  $x$ , ..., prvky uvnitř ...,  $y$ , ..., prvky vpravo ...)

Inverze, které nenavazují na prvek  $x$  nebo  $y$  zůstávají nezměněny. Inverze mezi prvky vlevo a  $x$  nebo  $y$  zůstávají nezměněny. Inverze mezi  $x$  nebo  $y$  a prvky vpravo zůstávají nezměněny. Inverze mezi  $x$  nebo  $y$  a prvky uvnitř po dvou vznikají nebo zanikají nebo se nemění. Inverze mezi  $x$  a  $y$  vznikne nebo zanikne.

**Důsledek:** Znaménko permutace poznáme podle počtu *transpozic* (jednoho prohození dvou prvků), které je potřeba na permutaci provést, aby byla převedena na generickou permutaci.

## Návrat k definici determinantu

**Definice:** Nechť  $\mathbf{A} = (a_{i,j}) \in \mathbf{R}^{n,n}$  je čtvercová matice. Číslo

$$\det \mathbf{A} = \sum_{\text{permutace } \pi=(i_1, i_2, \dots, i_n)} \text{sgn } \pi \cdot a_{1, i_1} a_{2, i_2} \cdots a_{n, i_n}$$

- Užitečná je představa šachových věží.
- Příklad pro matice typu  $(1, 1), (2, 2), (3, 3) \dots$  Sarrusovo pravidlo.
- Pozor, pro matice větších typů Sarrusovo pravidlo nelze použít!

## Determinant horní trojúhelníkové matice

$$\det \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n-1} & a_{1,n} \\ 0 & a_{2,2} & \dots & a_{2,n-1} & a_{2,n} \\ 0 & 0 & \dots & a_{3,n-1} & a_{3,n} \\ & & \vdots & & \\ 0 & 0 & \dots & 0 & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

je roven součinu prvků na diagonále:  $a_{1,1} \cdot a_{2,2} \cdot a_{3,3} \cdots a_{n,n}$ .

Vidí všichni proč?

## Základní vlastnosti determinantu

- Prohození řádků změni znaménko determinantu
- Matice se dvěma stejnými řádky má nulový determinant
- Pronásobení jediného řádku  $\alpha$ -krát zvětší  $\alpha$ -krát i determinant
- Je-li jeden řádek zapsaný jakou součet dvou částí, pak determinant takové matice je roven součtu determinantů matic, ve kterých jsou místo tohoto řádku jen jeho části:

$$\det \begin{pmatrix} \vdots \\ \vec{a}_i \\ \vdots \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} \vdots \\ \vec{b}_i \\ \vdots \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \vdots \\ \vec{a}_i + \vec{b}_i \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

- Třetí typ kroku eliminační metody nezmění determinant.

## Metoda výpočtu determinantu

**Algoritmus:** Eliminací převedeme danou matici  $\mathbf{A}$  na horní trojúhelníkovou matici  $\mathbf{U}$ . Pokud během eliminace použijeme první nebo druhý typ kroku eliminace, je potřeba si poznamenat, jak se změnil determinant. Třetí typ kroku nemění determinant vůbec. Konečně  $\det \mathbf{U}$  je součin prvků na diagonále.

Složitost algoritmu:  $n^3$ . Výrazná úspora proti vzorci v definici, který má složitost  $n!$ .

## Příklad

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -5 & -2 \\ 0 & -6 & -11 & -10 \\ 0 & -5 & -7 & -8 \end{vmatrix} = (-1)^4 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 6 & 11 & 10 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 5 & 7 & 8 \end{vmatrix} =$$

$$\frac{1}{6} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 6 & 11 & 10 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 30 & 42 & 48 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 6 & 11 & 10 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & -13 & -2 \end{vmatrix} =$$

$$\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{5} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 6 & 11 & 10 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & -65 & -10 \end{vmatrix} = \frac{1}{30} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 6 & 11 & 10 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 16 \end{vmatrix} = 16.$$

Za chvíli uvidíme, že to lze spočítat jednodušeji...

## Řádky a sloupce jedno jest

**Tvrzení:**  $\det \mathbf{A} = \det \mathbf{A}^T$ .

**Důkaz:** Mám permutaci  $(i_1, i_2, \dots, i_n)$  a podle ní provedu sloupcový výběr prvků matice a vynásobím mezi sebou:

$$a_{i_1,1} \cdot a_{i_2,2} \cdots a_{i_n,n} = a_{1,j_1} \cdot a_{2,j_2} \cdots a_{n,j_n}$$

Součin reálných čísel je komutativní, tak jsem činitele uspořádal podle velikosti řádkového indexu. Jaký je vztah mezi permutacemi:  $(i_1, i_2, \dots, i_n)$  a  $(j_1, j_2, \dots, j_n)$ ? Jsou si vzájemně inverzní. A inverzní permutace mají stejné znaménko. Takže vzorce s řádkovým i sloupcovým výběrem dávají stejný výsledek.

**Důsledek:** Při eliminaci za účelem výpočtu determinantu lze libovolně přecházet mezi řádkovými a sloupcovými úpravami.

## Regulární a singulární matice

**Věta:** Matice  $\mathbf{A}$  je regulární, právě když  $\det \mathbf{A} \neq 0$ .

Důkaz:  $\mathbf{A}$  je regulární právě když  $\mathbf{A} \sim \mathbf{E}$ . Dále si stačí uvědomit, že Gaussova eliminace nemění nulovost determinantu.

## Determinant součinu matic

**Věta:** Pro dvě čtvercové matice typu  $(n, n)$  platí

$$\det(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = (\det \mathbf{A}) \cdot (\det \mathbf{B}).$$

Důkaz\*: Lze provést  $\mathbf{A} \sim \mathbf{U}_1$  řádkovými eliminačními úpravami, aby se nezměnil determinant. Dále lze převést  $\mathbf{B}$  na  $\mathbf{U}_2$  sloupcovými eliminačními úpravami tak, že se nezmění determinant. Snadno se ukáže, že

$$\det(\mathbf{U}_1 \cdot \mathbf{U}_2) = (\det \mathbf{U}_1) \cdot (\det \mathbf{U}_2)$$

Existují matice  $\mathbf{P}_1, \mathbf{P}_2$  tak, že  $\mathbf{U}_1 = \mathbf{P}_1 \mathbf{A}$ ,  $\mathbf{U}_2 = \mathbf{B} \mathbf{P}_2$ . Stejně řádkové i sloupcové úpravy provedeme na  $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ , tedy  $\mathbf{P}_1 \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \mathbf{P}_2 = \mathbf{U}_1 \cdot \mathbf{U}_2$ . Úpravy nemění determinant, takže

$$\begin{aligned} \det(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) &= \det(\mathbf{P}_1 \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \mathbf{P}_2) = \det(\mathbf{U}_1 \cdot \mathbf{U}_2) = \\ &= (\det \mathbf{U}_1) \cdot (\det \mathbf{U}_2) = (\det \mathbf{A}) \cdot (\det \mathbf{B}). \end{aligned}$$

## Důsledky věty o determinantu součinu

- $\det \mathbf{A}^{-1} = 1 / \det \mathbf{A}$
- Je-li  $\mathbf{A} = \mathbf{L} \mathbf{U}$  rozklad matice  $\mathbf{A}$ , pak  $\det \mathbf{A} = \det \mathbf{U}$ , tedy  $\det \mathbf{A}$  je roven součinu diagonálních prvků v matici  $\mathbf{U}$ . (připomínám, že matice  $\mathbf{L}$  má na diagonále jedničky).

## Rozvoj determinantu podle řádku

**Terminologie:** Vyřadíme-li ze čtvercové matice  $\mathbf{A} \in \mathbf{R}^{n,n}$   $i$ -tý řádek a  $j$ -tý sloupec, dostáváme matici  $\mathbf{A}_{i,j} \in \mathbf{R}^{n-1,n-1}$ . Číslo

$$D_{i,j} = (-1)^{i+j} \det \mathbf{A}_{i,j}$$

se nazývá *doplňek matice  $\mathbf{A}$  v pozici  $(i,j)$* .

**Věta o rozvoji:** Nechť  $D_{i,j}$  jsou doplňky čtvercové matice  $\mathbf{A} = (a_{i,j})$ . Pak platí

$$\det \mathbf{A} = a_{r,1} D_{r,1} + a_{r,2} D_{r,2} + \dots + a_{r,n} D_{r,n}.$$

Náznak důkazu: vytkněte ze součtu z definice determinantu  $a_{r,1}$  (jen z těch sčítanců, kde se  $a_{r,1}$  vyskytuje), dále vytkněte  $a_{r,2}$  atd. až  $a_{r,n}$ . V závorkách po vytknutí dostanete  $D_{r,i}$ .

## Rozjímání nad větou o rozvoji

- Protože  $\det \mathbf{A} = \det \mathbf{A}^T$ , platí analogická věta o rozvoji podle sloupce
- Je-li v řádku/sloupci hodně nul, je v součtu podle věty o rozvoji hodně nulových sčítanců. Stačí zapsat jen ty nenulové a redukovat výpočet determinantu matice typu  $(n, n)$  na několik (málo) determinantů matic typu  $(n-1, n-1)$ .
- Pozor: rekurzivní volání výpočtu determinantu podle věty o rozvoji má složitost  $n!$ , takže tento algoritmus je nepoužitelný.
- Důsledkem věty o rozvoji je tvrzení:

$$0 = a_{r,1}D_{k,1} + a_{r,2}D_{k,2} + \dots + a_{r,n}D_{k,n} \quad \text{pro } r \neq k.$$

Stačí provést větu o rozvoji na matici se dvěma stejnými řádky.

- Věta o rozvoji má řadu dalších teoretických důsledků, některé se dozvíme později...

## Příklad

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 4 & 1 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} =$$

$$- \begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 2 & -2 & 0 \\ -1 & -7 & 0 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 7 \end{vmatrix} = 2 \cdot 8 = 16.$$

## Inverzní matice pomocí doplňků

Je-li  $\mathbf{A} \in \mathbf{R}^{n,n}$  regulární, pak

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{A}} \mathbf{D}^T,$$

kde  $\mathbf{D} = (D_{i,j})$  je matice doplňků  $\mathbf{A}$  v pozicích  $(i,j)$ .

Důkaz: Ověříme, že  $\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{E}$ .

Označíme  $\mathbf{A} = (a_{i,j})$ ,  $\mathbf{D}^T = (D_{k,j})$ ,  $\mathbf{E} = (e_{i,k})$ .

$$e_{i,k} = \sum_{j=1}^n a_{i,j} \frac{1}{\det \mathbf{A}} D_{k,j} = \frac{1}{\det \mathbf{A}} (a_{i,1}D_{k,1} + a_{i,2}D_{k,2} + \dots + a_{i,n}D_{k,n}) =$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{\det \mathbf{A}} \det \mathbf{A} = 1 & \text{pro } i = k, \\ \frac{1}{\det \mathbf{A}} \cdot 0 = 0 & \text{pro } i \neq k. \end{cases}$$

Využili jsme větu o rozvoji determinantu podle  $i$ -tého řádku.

## Příklad: inverze k matici typu (2, 2)

Je dána matice

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Matice doplňků k této matici je

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$$

Takže

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{A}} \mathbf{D}^T = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

**Příklad: inverze matice pomocí doplňků**

Je dána matice  $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ .

Matice doplňků je:

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -2 \\ 4 & -5 & 2 \\ 2 & -4 & 2 \end{pmatrix},$$

takže:  $\det \mathbf{A} = -2$ ,  $\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{A}} \mathbf{D}^T = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -2 & 4 & 2 \\ 3 & -5 & -4 \\ -2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ .